أزابـريـــل ®

خافض لضغط الدم المرتفع

التركيب:

* **كل قرص من أزابريل ٢٠** يحتوي على:
ليزينوبريل ٢٠ مجم (على هيئة ليزينوبريل دايهيدرات) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي.
* **كل قرص من أزابريل ١٠** يحتوي على:
ليزينوبريل ١٠ مجم (على هيئة ليزينوبريل دايهيدرات) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي.
* **كل قرص من أزابريل ٥** يحتوي على:
ليزينوبريل ٥ مجم (على هيئة ليزينوبريل دايهيدرات) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي.
* **كل قرص من أزابريل ٢,٥** يحتوي على:
ليزينوبريل ٢,٥ مجم (على هيئة ليزينوبريل دايهيدرات) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي.

المجموعة العلاجية:

مثبط للانزيم المحول للأنجيوتنسين.

دواعي الاستعمال:

يستخدم **أزابريل** لعلاج:
- **إرتفاع ضغط الدم.**
- **فشل القلب.**
- المرضى المستقرين سريرياً في **غضون ٢٤ساعة من** إحتشاء عضلة القلب الحاد (العلاج قصير المدى).
- **أمراض الكلى في مرضى** إرتفاع ضغط الدم الذين يعانون من مرض السكري نوع II.
- إعتلال الكلية في المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع I.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

* يجب اعطاء **أزابريل** فمويا كجرعة واحدة يومياً مع او بدون الطعام.
* **البالغين:**

ارتفاع ضغط الدم:
الجرعة الأولى هي **١٠ مجم من أزابريل** عن طريق الفم مرة في اليوم، أما إذا استخدم بالإضافة للمدرات أو في تحليل مرض القلب أو إستنفاد الحجم فالجرعة الأولية (٢,٥-٥ مجم) مرة في اليوم، وتبلغ الجرعة المستمرة ٢٠ مجم عن طريق الفم مرة يومياً والجرعة القصوى هي ٨٠ مجم مرة يومياً.
فشل القلب:
(٢,٥-٥ مجم) من أزابريل يومياً كجرعة أولية تحت إشراف طبي مستمر، تزيد الجرعة (لا يزيد عن١٠ ملغ) في خطوات **على فترات من ٢** أسابيع على الأقل حتى تبلغ **٣٥** ملغ كحد أقصى مرة واحدة يومياً.
احتشاء عضلة القلب الحاد:
- **الجرعة الأولية لأزابريل هي ٥** مجم عن طريق **الفم خلال ٢٤** ساعة إذا كان الضغط الإنقباضي أعلى من **١٢٠ملم زئبق،** ويتبعه **٥ مجم بعد ٢٤** ساعة كحد أقصى، ثم **١٠مجم بعد ٢٤** ساعة ويواصل ١٠ مجم مرة يومياً لمدة ٦ أسابيع. إذا كان **الضغط الإنقباضي ١٠٠- ١٢٠**ملم زئبق فإن الجرعة الأولية **٢,٥** مجم مرة في اليوم إذا حدث إنخفاض **في الضغط، ترفع إلى ٥** مجم كجرعة مستمرة يومياً.
- **اذا حدث أنخفاض في ضغط الدم (الضغط الإنقباضي ١٠٠ملم زئبق أو أقل)** تعطى جرعة مستمرة يومية مقدارها **٥ مجم مع** تقليلها مؤقتاً إلى **٢,٥ مجم إذا دعت الحاجة لذلك.**
- **إذا إستمر إنخفاض ضغط الدم (الضغط الإنقباضي أقل من ٩٠** ملم زئبق لمدة تزيد عن ساعة واحدة) فينبغي التوقف عن **استعمال أزابريل.**
الاعتلال الكلوي الناتج عن داء السكري:
- الجرعة الأولية الموصى بها هي(٢,٥-٥) مجم يومياً ويتم تعديلها حسب الإستجابة وتكون الجرعة الإعتيادية من ١٠-٢٠ مجم يومياً.
- ينبغي تعديل جرعة **أزابريل** لدى المرضى المصابين بقصور الكلى، كما يلي:

معدل تصفية الكريتينين (مل / دقيقة)	الجرعة المبدئية (مجم / يوم)
≥ ٧٠ > ٣٠ مل / دقيقة	٥-١٠ مجم
≥ ٣٠ > ١٠ مل / دقيقة	٢,٥-٥ مجم
< ١٠ مل / دقيقة	٢,٥ مجم

الإستخدام في الأطفال المصابين بإرتفاع ضغط الدم (٦-١٦سنة):
الجرعة الأولية الموصى بها هي **٢,٥ مجم** مرة واحدة يومياً **في المرضى** ٢٠ إلى <٥٠ كجم، و **٥ مجم مرة واحدة يومياً في المرضى** ≤ ٥٠ كجم.
لا يوصى **بإستخدام أزابريل للأطفال دون** سن ٦ **سنوات أو في الأطفال** المصابين **بمشاكل حادة في الكلى.**

موانع الاستعمال:

يمنع استخدام **أزابريل** للمرضى الذين لديهم:
- **الحساسية المفرطة** لليزينوبريل، **مثبطات** (ACE) **الاخرى او اي من المكونات الاخرى لاقراص ازابريل.**
- تاريخ مرضي بوذمة وعائية متعلقة بالعلاج السابق بمثبطات (ACE).
- وذمة وعائية وراثية او مجهولة الاسباب.
- الاشهر الثلاثة الثانية والثالثة للحمل.
- **الجمع** مع الأدوية التي تحتوي على أليسكيرين في المرضى الذين يعانون من مرض السكري (النوع الأول أو الثاني) أو **قصور كلوي متوسط الى حاد** (GFR <٦٠ مل / دقيقة / ١,٧٣م٢).

الاعراض الجانبية:
- **أكثر الاعراض الجانبية شيوعا تشمل:** الدوخة، الصداع، التعب، السعال، الإسهال، القيء.
- **الاعراض الجانبية الأخرى تشمل: المتعلقة بالوقوف** (**تشمل إنخفاض ضغط الدم**)، **الطفح الجلدي وضعف العضلات.**
- **الاعراض الجانبية نادرة الحدوث تشمل: التخثل، ألم في الصدر،** الصفراء، تغيرات في المزاج، الحكة، الشرى، الحمى، **جفاف الفم، تضخم الصدر في الذكور، الصلع، داء الصدف، قسرع** القلب، حادثة وعائية دماغية، **إحتشاء عضلة القلب، ارتفاع** انزيمات الكبد، إضطرابات في النوم، ضعف جنسي، إرتباك ومتلازمة رينود.
- **اعراض جانبية نادرة جداً تشمل:** إلتهاب أسناخ الرئة **التعسبي**، عرق غزير، وذمة وعائية، **القناع**، متلازمة ستيفن - **جونسون وتنخر في أنسجة البشرة.**

الاحتياطات:
- ينبغي استخدام ليزينوبريل بحذر لدى المرضى الذين يتلقون مدرات البول، جرعة عالية من موسع الاوعية الدموية، **العلاج** بمثبطات المناعة، علاج قلة الحساسية، نظام غذائي منخفض الصوديوم، ملاحق بوتاسيوم، الخضوع لعملية جراحية كبرى، الديلزة، المرضى المصابون بجفاف، **فشل قلبي**، امراض الاوعية الدموية المخية، امراض وعائية كلوية، نقص حجم الدم، نقص صوديوم الدم، فرط بوتاسيوم الدم، داء السكري، انخفاض ضغط الدم، امراض الاوعية الدموية الطرفية، **تصلب** الشرايين العام، امراض اوعية الكولاجين الدموية، ضيق الابهر الشديد او اعتلال عضلة القلب الضخامي.
- ينبغي اخذ مثبطات ACE المحفزة للسعال كجزء من التشخيص التفريقي للسعال.
- قد يكون الليزينوبريل اقل فعالية في خفض ضغط الدم في المرضى ذوي البشرة الداكنة من ذوي البشرة غير الداكنة كما انه يتسبب في ارتفاع معدل الوذمة الوعائية لدى المرضى ذوي البشرة الداكنة من ذوي البشرة غير الداكنة.
- المرضى الذين يتلقون ليزينوبريل والذين يصابون ببرقان، ارتفاع ملحوظ في انزيمات الكبد او وذمة وعائية في الوجه، **الاطراف، للنفاه، اللسان، المزمار و/او الحنجرة** يجب عليهم وقف العلاج بالليزينوبريل وتلقي المتابعة الطبية المناسبة.

فرط الجرعة:
- الأعراض المصاحبة عند زيادة جرعة مثبطات الإنزيم المحول للانجيوتنسين **قد تشمل:**
إنخفاض ضغط الدم، صدمة في الدورة الدموية، إضطرابات الالكتروليت، الفشل **الكلوي، فرط التنفس، تسرع القلب، التخثل، بطء القلب، الدوخة، القلق والسعال.**
- العلاج الموصى به عند زيادة الجرعة هو حقن المحلول الملحي الطبيعي.

التفاعلات الدوائية:
- الادوية التي تحفز من تاثير الليزينوبريل الخافض لضغط الدم عند الاستخدام المتزامن هي: (الديسليوكين، حاصرات الفا، ادوية التخدير العام، مثبطات المونو امين اوكسيديز ، مضادات الذهان، المزيلة للقلق، المنومات، حاصرات بيتا، حاصرات قنوات الكالسيوم، كلونيدين، ديازوكسايد، مدرات البول، ليفودوبا، ميثايل دوبا، موكسيسايليت، موكسونيدين، باكلوفين، تيزانيدين، النترات، البروستاديل، الهيدرالازين، مينوكسيديل ونيتروبروسيد الصوديوم).
- الادوية التي تعاكس تاثير الليزينوبريل الخافض لضغط الدم عند الاستخدام المتزامن هي: (الكورتيكوستيرويدات، مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية والاستروجينات).
- الادوية التي تزيد من خطر فرط بوتاسيوم الدم عند الاستخدام المتزامن مع ليزينوبريل هي: (**مضادات مستقبلات** الانجيوتنسينII ، ترامبيثوبريم، الهيبارين، سيكلوسبوريم واملاح الصوديوم).
- الاستخدام المتزامن لليزينوبريل مع:
الليثيوم: يقلل من طرح الليثيوم.
الوبنبورينول: يزيد من خطر نقص الكريات البيضاء وردود الفعل التحسسية المفرطة خاصة في حالات القصور الكلوي.
مضادات الالتهاب غير الاسيرويدية: يزيد من خطر القصور الكلوي.
الانسولين، الميتفورمين والسلفونيل يوريا: تعزز من تاثيرهم الخافض لسكر الدم.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة:
- **الحمل:** لا يوصى باستخدام ليزينوبريل خلال الحمل واذا تم إكتشاف الحمل خلال فترة العلاج فيجب وقف استخدام ليزينوبريل فورا لأنه من المحتمل ان يؤثر على التحكم بضغط دم الأجنة و **المواليد و وظائف الكلى، كما قد سجلت حالات خلل في الدماغ و قص النخط.**
- **الارضاع:** لاينصح بإستخدام ليزينوبريل **للنساء المرضعات.**

القيادة و استخدام الماكينات:
عند قيادة المركبات أو آلات التشغيل، ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار **أن الدوخه أو التعب قد تحدث** أحياناً.

الخصائص:

التاثير الدوائي:
- ليزينوبريل هو دواء مثبط لإنزيم بيبتيدايل داي بيتيداز مما ينتج عنه تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين الذي يعمل على تحويل أنجيوتينسين I إلى أنجيوتينسين II البيتيد المضيق للاوعية الدموية، يساعد الأنجيوتينسين II في إفراز الألدوستيرون من قشرة الغدة الكظرية.
- تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين يؤدي لنقص تراكيز أنجيوتينسين II مما يؤدي لزيادة تركيز البوتاسيوم في الدم.الآلية التي يعمل بها الليزينوبريل على خفض ضغط الدم تعرف بانه يعمل على إيقاف عمل نظام رنين - أنجيوتينسين – ألدوستيرون مما يؤدي لخفض ضغط الدم المرتفع.
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومنها الليزينوبريل تعمل على تكوين أنجيوتنسين II وتكسير البراديكينين ويعمل **على** عسر وظيفي في الأميلورات البطانية.

الحركية الدوائية:
الإمتصاص: عند أخذ الليزينوبريل يصل تركيزه إلى أعلى مستوى خلال ٧ ساعات، ولكن يمكن ان يحدث بعض التأخير في الزمن الذي يأخذه ليصل أعلى تركيز في المرضى الذين لديهم إحتشاء حاد في عضلة القلب.
متوسط إمتصاص الليزينوبريل **حوالي ٢٥%** . التوافر الحيوى المطلق يقل حوالي **١٦% لدى مرضى فشل** القلب، ولا يتأثر إمتصاص الليزينوبريل بوجود الغذاء.
التوزيع: الليزينوبريل لا يرتبط **بالبروتينات** في الدورة الدموية عدا الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.
الطرح: الليزينوبريل لا يحدث له إستقلاب ويفرز من غير تغيير في البول. تنقية الليزينوبريل عند الأصحاء **حوالي ٥٠**مل/دقيقة.
القصور الكبدي: قصور وظائف الكبد لدى مرضى تليف الكبد يؤدي إلى نقصان إمتصاص الليزينوبريل لكن يحدث زيادة في التعرض لليزينوبريل بحوالي ٥٠ % مقارنة بالأصحاء بسبب نقص التنقية.
فشل القلب: يزيد التعرض لليزينوبريل لدى مرضى **الفشل القلبي مقارنة بالأصحاء، لكن نسبة قص الإمتصاص** هي حوالي ١٦% **مقارنة مع الأصحاء.**
القصور الكلوي: القصور الكلوي يقلل من تخلص الليزينوبريل الذي يخرج عن طريق **الكلى**، لكن هذا النقصان يصبح مهماً طبياً فقط عندما يكون معدل ترشيح الكبيبات أقل من ٣٠ مل/دقيقة.
كبار السن: كبار السن لديهم مستوى دم وقيم عالية لـ AUC (زيادة حوالي٦٠%) **مقارنة بالشباب.**

المكونات الاخرى للدواء:

أزابريل ٢٠: فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، نشا، بوفيدون، إستيارات الماغنسيوم ، تالك **و صبغة غروب للنمس أصفر.**
أزابريل ١٠: فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، نشا، بوفيدون، إستيارات الماغنسيوم ، تالك **و** إريثروسين **أحمر.**
أزابريل ٥ : فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، نشا، بوفيدون، إستيارات الماغنسيوم ، تالك **و** إريثروسين **أحمر.**
أزابريل ٢,٥: فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، نشا، بوفيدون، إستيارات الماغنسيوم **و تالك.**

عدم التوافق:
لا يعرف.

مدة الصلاحية:
٢٤ شهر.

إحتياطات خاصة للتخزين:
- يحفظ بعيداً عن متناول **و طرالأطفال.**
- **لاتستخدم أقراص أزابريل** بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على العلبة.
- يجب ان يحفظ في مكان بارد، جاف، **درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م.**
- يجب أن يحفظ في العبوة الأصلية.

طبيعة ومحتويات العبوة:
- **العبوة تحتوي على٣ لشريطة.**
- كل شريط يحتوى على ١٠ أقراص.

إحتياطات خاصة للتخلص من الدواء:
- يجب عدم التخلص من الدواء عبر المياه أو الأوساخ المنزلية.
- **لستشر** الصيدلي إذا أردت التخلص من أدوية لا تحتاج إليها.
- هذه **الإجراءات تساعد** على حماية البيئة.

حامل اذن التسويق والشركة المصنعة:

أزال فارما
تلفون: ١٨٥٣٢٢٧٧٠ (٢٤٩+)
فاكس: ١٠٥٥١١٨٨٥٥ (٢٤٩+)
إيميل: azal@azalpharma.com
الموقع الإلكتروني: www.azalpharma.com

الابلاغ عن الاعراض الجانبية
المجلس القومي للادوية والسموم
فاكس: ١٨٣٥٣٢٢٦٣ (٢٤٩+)
البريد الإلكتروني: info@nmpb.gov.sd
الموقع الإلكتروني: www.nmpb.gov.sd

تعليمـــات للمريـض

- **الدواء مستحضر يؤثر على صحتك** واستهلاكه **خلافاً** للتعليمات يعرضك **للخطر** .
- **اتبع بدقة وصفة** الطبيب وطريقة **الاستعمال المنصوص** عليها وتعليمات الصيدلاني **الذي** صرفها .
- **إن** الطبيب والصيدلاني هما الخبيران **بالدواء** وبنفعه وضرره.
- **لا تقطع مدة العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك .**
- لا تكرر صرف الدواء **بدون** وصفه طبية .
- **احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.**

صنع بواسطة:
أزال فارما
السودان - الخرطوم

	Date	Sign.
R&D		
S.O.		
Q.C		
Q.A.		
Tec. Manager		

الأبعاد: ١٦×٢٤ سم
نوع الخط: Times New Roman
حجم الخط: 5.5
رقم البانتون: 376U
تاريخ التعديل: ٥-١٢-٢٠١٥