

جليميزال[®]

أقراص جليميزال 2

أقراص جليميزال 3

أقراص جليميزال 4

(جليمبيرايد)

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء لانها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- حافظ على هذه النشرة قبل البدء بتناول هذا الدواء لانها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك، لا تمرره إلى الآخرين. قد يضرهم، حتى لو أعراضهم هي نفس أعراضك.
- إذا حدثت لك أي آثار جانبية، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي. وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.
- ماذا يوجد في هذه النشرة**
- 1. ما هو جليميزال وفيه يستخدم.
- 2. قبل أن تأخذ جليميزال
- 3. كيف تأخذ جليميزال
- 4. الآثار الجانبية المحتملة
- 5. كيف نخزن جليميزال.
- 6. مزيد من المعلومات.

- 1. ما هو جليميزال و فيم يتم استخدامه**

جليميزال هو دواء يؤخذ عن طريق الفم للمساعدة على خفض نسبة السكر في الدم. وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مركبات السلفونيل يوريا. **جليميزال** يعمل عن طريق زيادة كمية الأنسولين التي تفرز من البنكرياس. الأنسولين يخفض من مستويات السكر في الدم.

- يستخد **جليميزال** لعلاج شكل معين من مرض السكري (النوع الثاني من داء السكري). عندما يكون اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة البدنية وخفض الوزن وحدهم غير قادرين على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

- 2. قبل أخذ جليميزال**

لا تأخذ **جليميزال** وأخبر طبيبك إذا:

- لديك حساسية من: جليمبيرايد أو مركبات السلفونيل يوريا الأخرى (الأدوية المستخدمة لخفض نسبة السكر في الدم مثل غليبيكلاميد) أو السلفوناميدات (أدوية الالتهابات البكتيرية مثل سلفاميثوكسازول) أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (المدرجة في القسم 6).

- لديك السكري المعتمد على الأنسولين (النوع الأول من داء السكري).

- لديك الحماض الكيتوني السكري (من مضاعفات مرض السكري عندما يرتفع مستوى الحمض في جسمك و قد تظهر عليك بعض من العلامات التالية: التعب، والشعور بالمرض (الغثاين)، وكثرة التبول وتصلب العضلات. كنت في غيبوبة السكري.

- لديك مرض كلوي حاد.

- لديك مرض كبدي حاد.

- لا تأخذ هذا الدواء إذا كان أي من الأمراض أعلاه تتلحق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، تحدث مع طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ **جليميزال**.

التحذيرات و الاحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء إذا:

- كنت تتعافى من إصابة، عملية، عدوى مع حمى، أو أي من أشكال الإجهاد الأخرى، أخبر طبيبك إذ أن التغيير المؤقت في العلاج قد يكون ضرورياً.

- لديك اضطرابات حادة في الكبد أو الكلى.

- إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أي مما ذكر ينطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلاني.

- خفض مستوى الهيموجلوبين وتكسير خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي) يمكن أن يحدث في المرضى الذين يتفقدون الزئيم جلكوز-3- فوسفات الفازع للهيديرجين.

- المعلومات المتوفرة عن استخدام جليمبيرايد في المرضي تحت 18 سنة من العمر محدودة. لذلك، لا ينصح استخدامه في هؤلاء المرضى.

معلومات هامة عن نقص سكر الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)

عندما تأخذ **جليميزال**، قد يحدث نقص سكر الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم). يرجى الإطلاع على ما سيذكر لاحقاً للحصول على معلومات إضافية حول نقص سكر الدم، وعلاماته و علاجه.

العوامل التالية يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بنقص سكر الدم:

- نقص التغذية، عدم انتظام وقت الوجبة، غياب أو تأخر الوجبة أو فترة الصيام.

- التغييرات في النظام الغذائي الخاص بك.

- أخذ جرعات من **جليميزال** أكثر من اللازم.

- عدم عمل الكلى بشكل صحيح.

- وجود مرض كبدي حاد.

- إذا كنت تعافى من اضطرابات هرمونية محددة (اضطرابات في الغدد الدرقية، الغدة النخامية أو قشرة الغدة الكظرية).

- شرب الكحول (وخصوصا عندما لا تتناول وجبة).

- أخذ بعض الأدوية الأخرى (انظر "13الأدوية الأخرى و جليميزال")

- إذا قمت بزيادة كمية التمارين التي تقوم بها وأنت لا تأكل ما يكفي من الغذاء أو تتناول الأغذية التي تحتوي على كمية كربوهيدرات أقل من المعتاد.

علامات نقص سكر الدم تشمل:

- الأم الجوع، الصداع، الغثاين، القيء، الحمور، النعاس، مشاكل في النوم، الأرق، الحوان، مشاكل في التركيز، انخفاض اليقظة وفترة رد الفعل، الاكتئاب، الارتباك، مشاكل في الكلام و البصر، ثقل اللسان، الاهتزاز، الشلل الجزئي، الدوخة والعمج.

- قد تحدث العلامات التالية أيضا: التعرق ، الجلد الندي، الطلق، سرعة أو زيادة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، الانتباه لضربات القلب، ألم شديد مفاجئ في الصدر الذي قد ينتشر إلى المناطق المجاورة (النوبة الصدرية وعدم انتظام ضربات القلب).

- وإذا استمر انخفاض مستويات السكر في الدم قد تعافى من إرتباك كبير (هذيان)، نوبات تشنج، وفقدان السيطرة على النفس، قد يكون التنفس ضئيلاً وضربات القلب بطيئة، قد تزدي إلى فقدان الوعي.

- الحالة السريرية لانخفاض مستوى السكر الحاد في الدم قد تشبه تلك الخاصة بالسكتة الدماغية.

علاج نقص سكر الدم:

في معظم الحالات علامات انخفاض السكر في الدم تتلاشي بسرعة كبيرة عندما تستهلك نوعا من السكر ، على سبيل المثال، مكعبات السكر، العصير والشاي المخلط. لذلك يجب عليك دائما أن تأخذ شكلا من أشكال السكر معك (مثل مكعبات السكر) تذكر أن المحليات الاصطناعية ليست فعالة. يرجى الاتصال بطبيبك أو اذهب إلى المستشفى إذا لم يساعد أخذ السكر أو إذا تكررت الأعراض.

اختبارات المعمل

يجب فحص مستوى السكر في الدم أو البول بانتظام. قد يجري الطبيب اختبارات الدم لرصد مستويات خلايا الدم و وظائف الكبد.

الأطفال والمراهقين

لا ينصح باستخدام **جليميزال** في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

الأدوية الأخرى و جليميزال

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، قد أخذت مؤخرا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى. قد يرغب طبيبك بتغيير الجرعة من **جليميزال** إذا كنت تأخذ أدوية أخرى، والتي قد تضعف أو تعزز تأثير **جليميزال** على مستوى السكر في الدم. - **يمكن للأدوية التالية أن تزيد من تأثير جليميزال على خفض مستوى السكر في الدم**، هذا يمكن أن يؤدي إلى مخاطر نقص سكر الدم:

- الأدوية الأخرى لعلاج داء السكري (مثل الأنسولين أو الميتفورمين).

- الأدوية لعلاج الالام و الالتهابات (الفينيل بيوتازون، زوبريويازون، الأوكسيفين بيوتازون، الأدوية التي تشابه الأسبيرين).

- الأدوية لعلاج الالتهابات المسالك البولية (مثل بعض السلفوناميدات طويلة المفعول).

- الأدوية لعلاج الالتهابات البكتيرية و الفطرية (التتراسيكلينات، الكلورامفينيكول، فلوكونازول، ميكونازول، الكيتوكون، كلاريتروميسين).

- الأدوية التي تمنع تخثر الدم (مشقات الكومارين مثل الوارفارين).

- الأدوية التي تدعم بناء العضلات (البناءة).

- الأدوية المستخدمة لتعويض الهرمونات الجنسية الذكورية.

- الأدوية لعلاج الاكتئاب (فلوكستين، مثيلطات ال MAO).

- الأدوية الخاصة بمستوى الكوليسترول في الدم (Fibrates).

- الأدوية الخاصة لضغط الدم المرتفع (ميثيلطات ACE).

- الأدوية التي تسمى مضادات اضطراب ضربات القلب المستخدمة للتحكم في ضربات القلب غير الطبيعية (سيبريداميد).

- الأدوية لعلاج القرص (ألوپورينول، والروبيسيد، سلفينيپرازون).

- الأدوية التي تستخدم لعلاج السرطان (سيكلوفوسفاميد، ايفوسفاميد، تروفوسفاميد).

- الأدوية المستخدمة لخفض الوزن (فينفلورامين).

- الأدوية المستخدمة لزيادة الدورة الدموية عندما تعطي بجرعة عالية عن طريق الوريد (البنيتوكسيفالين).

- الأدوية لعلاج الحساسية الأنفية مثل حمى القش (كزيتوكولنين).

- الأدوية التي تسمى المضادات السيمبثوية و المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، فشل القلب أو أعراض البروستاتا.

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير جليميزال على خفض السكر في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى خطر فرط سكر الدم:

- الأدوية التي تحتوي على الهرمونات الجنسية الأنثوية (الاستروجينات، البروجيستيوجينات).

- الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم و تسمى مدررات البول(الثيازيد).

- الأدوية المستخدمة لتنشيط الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين).

- الأدوية لعلاج الحساسية و الالتهابات (جلوكوكورتيكويد).

- الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية الشديدة (الكلوبرومازين وغيره ما من مشتقات الفينوثيازين).

- الأدوية المستخدمة لزيادة ضربات القلب، علاج الربو أو احتقان الأنف، السعال ونزلات البرد، لخفض الوزن،

أو المستخدمة في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة (الأدريدالين و المحاكيات السيمبثولية).

- الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع مستوى الكوليسترول (حمض الكيتوتريك).

- الأدوية لعلاج الإسهال عند استخدامها على المدى الطويل (المليينات).

- الأدوية لعلاج النزوات (الفينيتوين).

- الأدوية لعلاج العصبية ومشاكل النوم (باربيتورات).

- الأدوية لزيادة الضغط في العين (اسيتازولاميد).

- الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم و انخفاض نسبة السكر في الدم (ديازوكسيد).

- الأدوية لعلاج الالتهابات، و السل (ريفامپيسين).

- الأدوية لعلاج انخفاض الحاد لمستويات السكر في الدم (الجلوكاجون).

يمكن للأدوية التالية أن تزيد أو تقلل من تأثير جليميزال على خفض نسبة السكر في الدم:

- الأدوية لعلاج قرحة المعدة (تسمى مضادات H2).

- الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب مثل حاصرات بيتا، الكالدينين، غوانيثيدين و ريزبرينين.

هذه يمكن أيضا أن تخفض علامات نقص سكر الدم ، لذلك هناك حاجة إلى عناية خاصة عند أخذ هذه الأدوية.

جليميزال قد يزيد أو يضعف تأثير الأدوية التالية:

- الأدوية المضطحة لتخثر الدم (مشقات الكومارين مثل الوارفارين).

- كرايسيفيلام، وهو دواء يستخدم لخفض الكوليسترول، له تأثير على امتصاص **جليميزال**.

لتجنب هذا التأثير، يجب أن تكون قد تصحت بتأخذ **جليميزال** قبل كرايسيفيلام ب 4 ساعات على الأقل.

جليميزال مع الطعام والشراب والكحول

تناول الكحول قد يزيد أو ينقص من أثر **جليميزال** في خفض مستوى السكر في الدم بطريقة لا يمكن التنبؤ بها.

الحمل والرضاعة

الحمل: لا ينبغي أن يؤخذ **جليميزال** خلال فترة الحمل. أخبري طبيبك إذا كنتي، تعتقدن أنك قد تكونين أو تخططين

لتصبحي حاملا.

الرضاعة الطبيعية: قد يصل جليمبيرايد إلى حليب الثدي. لا ينبغي أن يؤخذ **جليميزال** خلال الرضاعة الطبيعية.

إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل أخذ أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

قد ترك على التركيز أو التفاعل قد تتخفض إذا تم خفض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)، أو رفعه (فرط سكر الدم) أو إذا حدثت مشاكل بصرية نتيجة لهذه الظروف. ضنع في اعتبارك أنك قد تعرض نفسك أو الآخرين للخطر (على سبيل المثال عند قيادة السيارة أو استخدام الآلات).

يرجى أن تسال طبيبك ما إذا كان يمكنك قيادة سيارة في حالة:

إذا كان لديك نوبات متكررة من نقص سكر الدم.

إذا كان لديك بصورة ظلية أو ليس لديك علامات تحذير من نقص السكر في الدم.

جليميزال يحتوي على الكلتوز.

إذا قبل لك من قبل الطبيب أنه لا يمكنك أن تتحمل بعض السكريات، اتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تأخذ جليميزال

أخذ هذا الدواء

خذ هذا الدواء عن طريق الفم، قبل أو مع الوجبة الرئيسية الأولى من اليوم (عادة وجبة الإفطار). إذا كنت لا تتناول وجبة الإفطار يجب أن تأخذ الدواء في الموعد المحدد على النحو الذي يحدده لك الطبيب. من المهم ألا تترك أي وجبة عندما تأخذ **جليميزال**.

كم تأخذ

جرعة **جليميزال** تعتمد على مدي حوجتك، حالتك ونتائج اختبارات السكر في الدم والبول ويتم تحديدها من قبل الطبيب. لا تأخذ أقرص أكثر من التي يصفها الطبيب.

جرعة البداية المعتادة هي 1 ملغم مرة واحدة يوميا.

إذا أزم الأمر، فإن طبيبك قد يزيد الجرعة بعد كل 1-2 أسبوع من العلاج.

الحذ الأهمي للجرعة الموصى بها هي 6 ملغم في اليوم.

العلاج المركب من جليمبيرايد بالإضافة إلى الميتفورمين أو من جليمبيرايد بالإضافة إلى الأنسولين. في مثل هذه الحالة طبيبك سوف يحدد الجرعة المناسبة من جليمبيرايد، ميتفورمين أو الأنسولين بشكل فردي بالنسبة لك. قد تحتاج جرعة **جليميزال** إلى التعديل إذا قمت بتغيير الوزن، تغيير نمط حياتك، أو إذا كنت تحت الكثير من الإجهاد. يرجى التحدث إلى طبيبك إذا كان أي من هذه الحالات ينطبق عليك.

إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء ضئيف جدا أو قوي جدا لا تغير الجرعة بنفسك، ولكن اسأل طبيبك.

إذا كنت تأخذ جليميزال أكثر مما يجب

إذا حدث و أخذت الكثير من **جليميزال** أو جرعة إضافية هناك خطر نقص سكر الدم (علامات "نقص سكر الدم"، انظر القسم 2)، ويالغي يجب أن تستهلك على الفور ما يكفي من السكر (مثل شريط صغير من مكعبات السكر، العصير المحلى والشاي المحلى) وإيلاج الطبيب فوراً.

عند معالجة نقص سكر الدم بسبب تناول جرعتي في **جليميزال** أو الأطفال، يجب التحكم بعناية في كمية السكر المعطى لتجنب إمكانية حدوث فرط سكر الدم الخطير. لا يجب إعطاء الأشخاص في حالة اللاوعي طعام أو شراب. بما أن حالة نقص سكر الدم قد تستمر لبعض الوقت من المهم جداً مراقبة المريض بعناية حتى لا يكون هناك أي خطر أكثر من ذلك. دخول المستشفى قد يكون ضروريا و لأخذ الحيلة. أ عرض على الطبيب العوبة أو الأقراص المتبقية، حتي يعرف الطبيب ما تم أخذه.

الحالات الشديدة من نقص سكر الدم التي صاحبها فقدان الوعي والغيبوبة هي حالة من حالات الطوارئ الطبية التي تتطلب معالجة طبية فورية والدخول إلى المستشفى. قد يكون من المفيد أن تخبر عائلتك وأصدقائك باستدعاء الطبيب فوراً إذا كان هناك يحدث لك.

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ جليميزال

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات المنسية.

إذا توقفت عن تناول جليميزال

في حالة قطع أو توقف العلاج يجب أن تكون علم بأن التأثير المطلوب لخفض نسبة السكر في الدم لا يتحقق أو أن المرض سيزداد سوا مرة أخرى.

استمر بأخذ **جليميزال** حتى يخبرك طبيبك بأن تتوقف.

بما أن كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب آثاراً جانبية ، على الرغم من أن الجميع لا تحدث لهم.

أخبر طبيبك فوراً إذا كنت تواجه أي من الأعراض التالية:

- الحساسية (بما في ذلك التهاب الأوعية الدموية، في كثير من الأحيان مع الطفح الجلدي) والتي قد تتطور إلى ردود فعل خطيرة مع صعوبة في التنفس، انخفاض ضغط الدم وقد تتطور إلى صدمة.

- وظائف كبد غير طبيعية بما في ذلك إصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، مشاكل في تدفق الصفراء و التهاب الكبد أو فشل الكبد.

- الحساسية (فرط الحساسية) في الجلد مثل الحكة، الطفح الجلدي، انتفاخات حمرة وزيادة التحسس من أشعة الشمس.

- بعض أمراض الحساسية الخفيفة قد تتطور إلى ردود فعل خطيرة.

- نقص سكر الدم الشديد بما في ذلك فقدان الوعي، انخفاض ضغط الدم وقد تتطور إلى غيبوبة.

حدثت الآثار الجانبية التالية عند بعض المرضى حين أخذ جليمبيرايد:
الآثار الجانبية الشائعة (قد تحدث لشخص واحد من بين كل ألف شخص)
انخفاض نسبة السكر في الدم من المستوى الطبيعي (نقص سكر الدم) (انظر القسم 2).

انخفاض في عدد خلايا الدم:

- المصطحب الدموية (مما يزيد من خطر حدوث نزيف أو كدمات).

- خلايا الدم البيضاء (مما يسهل من حدوث العدوى).

- خلايا الدم الحمراء (التي يمكن أن تجعل الجلد شاحب وتسبب الضعف أو ضيق التنفس).

هذه المشاكل عادة تحسن بعد التوقف عن تناول **جليميزال**.

الآثار الجانبية الشائعة جدا (قد تحدث لشخص واحد من بين كل 10 ألف شخص)
الحساسية (بما في ذلك التهاب الأوعية الدموية، في كثير من الأحيان مع الطفح الجلدي) والتي قد تتطور إلى ردود فعل خطيرة مع صعوبة في التنفس، و انخفاض في ضغط الدم وتنتور أحيانا لصمة. إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض، أخبر طبيبك فوراً.

- وظائف كبد غير طبيعية بما في ذلك إصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، ضعف تدفق الصفراء و التهاب الكبد أو فشل الكبد. إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض، أخبر طبيبك فوراً.

- التوكم أو الامساك بالتوكم، الإسهال، الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ، وآلام بالبطن.

- النقص في كمية الصوديوم في الدم (الذي يظهر في اختبارات الدم).

الآثار الجانبية الأخرى تشمل:

- قد تحدث الحساسية (فرط الحساسية) في الجلد مثل الحكة و الطفح الجلدي، انتفاخات حمرة، وزيادة التحسس من أشعة الشمس.

بعض أعراض الحساسية خفيفة قد تتطور إلى ردود فعل خطيرة مع مشاكل في التنفس أو البلع، تورم في الشفتين، الحلق أو اللسان. لذلك في حال حدوث واحدة من هذه الآثار الجانبية، أخبر طبيبك فوراً.

- قد تحدث تفاعلات تحسسية مع مركبات السلفونيل يوريا، السلفوناميدات، أو الأدوية ذات الصلة.

- قد تحدث مشاكل في بصرك عند بداية العلاج مع **جليميزال**. ويرجع ذلك إلى التغيرات في مستويات السكر

في الدم و يجب أن تحسن قريبا.

- زيادة إنزيمات الكبد.

- نزيف غير عادي أو كدمات شديدة تحت الجلد.

5. كيف نخزن جليميزال

- يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

- إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

- لا تقم بنخزبه فوق 30 درجة مئوية.

- يخزن في العبوة الأصلية وذلك للحماية من الرطوبة.

- إذا تغير لون الأقراص أو ظهرت أي علامات تال على التدهور، أطلب المشورة من الصيدلي.

- تذكر إذا طلب منك الطبيب التوقف عن تناول هذا الدواء، أعد أي أقراص غير مستخدمة إلى الصيدلي للتخلص الآمن. ابقى هذا الدواء فقط إذا طلب منك طبيبك.

- لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.

- اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة.

- هذه التاثيرات سوف تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات أخرى

العامة الفعالة هي جليمبيرايد.

كل قرص من **جليميزال 2** يحتوي على 2 ملغم من جليمبيرايد.

كل قرص من **جليميزال 3** يحتوي على 3 ملغم من جليمبيرايد.

كل قرص من **جليميزال 4** يحتوي على 4 ملغم من جليمبيرايد.

الكورسات الأخرى هي: لاكلوز، سليولوز نباتي، صوديوم ستارش جلايكوليت، استيرات المغنيسيوم، الليفودن و مادة ملونة (**جليميزال 2** يحتوي على الإنديفو كارمين و أكسيد الحديد الأصفر.

جليميزال 3 يحتوي على أكسيد الحديد الأصفر. **جليميزال 4** يحتوي على الإنديفو كارمين).

كيف يبدو جليميزال و ما هي محتويات العبوة

أقراص **جليميزال 2** خضراء اللون، بيضاوية الشكل مع خط منصف بالجهتين.

أقراص **جليميزال 3** صفراء شاحبة، بيضاوية الشكل مع خط منصف بالجهتين.

أقراص **جليميزال 4** زرقاء خافتة، بيضاوية الشكل مع خط منصف بالجهتين.

يتم توفيره في عبوة تحمي على 3 أشربة، كل شريط يحتوي على 10 أقراص.

حامل إنن التسويق والشركة المنتجة:

آزال فارما:

تلفون: 185322770 (+249)

فاكس: 155118855 (+249)

إيميل: azal@azalpharma.com

الموقع الإلكتروني: www.azalpharma.com

الإعاع من الاعرض جليبية

فحص نفوسى تكميلى ولعموم

هاتف: 222631835249(+)

فيم: info@nmpb.gov.sd

للمراجع الالكترونى: www.nmpb.gov.sd

تعليمات للمريض

- الدواء - مستحضر يوتر على مسحتك واستهلكه خلافاً للتعليمات

بعرض الخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها

وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها.

- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بدواء وينبغي وصره.

- لا ترفع دمن العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

صنع بواسطة:

آزال فارما.

الخرطوم - السودان



الأبعاد: 20×28 سم
نوع الخط:Times New Roman
حجم الخط:5.5
رقم البانتون : 1795 U
تاريخ التعديل: 2017-7-25