

أوستيوزال[®]

مكمل غذائي ولعظام اقوي

الحمل والإرضاع:

- يمكن إستعمال أوستيوزال[®] أثناء الحمل والإرضاع عند نصح الطبيب.
إحتياطات خاصة للتخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال .
- يجب أن يحفظ في مكان بارد، جاف و درجة حرارة لا تتعدى 30° م.
- يجب أن يحفظ في العبوة الأصلية.

طبيعة ومحتويات العبوة:

- عبوة تحتوي على 3 أشرطة.
- كل شريط يحتوي على 10 أقراص.

حامل إبن التسويق والشركة المصنعة:

أزال فارما.
تلفون: (+249)185322770
فاكس: (+249) 155118855
ايميل: azal@azalpharma.com
الموقع الإلكتروني: www.azalpharma.com

التركيب:

- كل حبة مغلفة من أوستيوزال[®] تحتوي على:

- فيتامين د3
- كالسيوم (على هيئة كربونات الكالسيوم) 400 مجم
- ماغنيسيوم (على هيئة أوكسيد المغنيسيوم) 150 مجم
- زنك (على هيئة كبريتات الزنك) 5 مجم

الخصائص:

- أوستيوزال[®] عبارة عن مجموعة من الفيتامينات و المعادن.
- فيتامين د3: مفيد للوقاية وعلاج الكساح. أيضاً مفيد لعلاج هشاشة العظام، لين العظام و فقدان العظام في الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة جار الدرقية.

- المغنيسيوم: يساعد في تكوين الهيموغلوبين و نزوح كريات الدم الحمراء.
- الكالسيوم: يشارك في الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للعضلات و العصب و ضروري من أجل الوظيفة الطبيعية للقلب وتختثر الدم.

- الزنك: يحتاج اليه الجهاز المناعي للجسم حتى يعمل بصورة صحيحة.

يلعب دوراً في انقسام الخلية، نمو الخلية، التام الجروح و تكسير

الكاربوهيدرات، أيضاً يحتاج اليه في نمو و تطوير الجسم خلال الحمل،

الرضاعة و الطفولة.

دواعي الإستعمال:

* يستعمل أوستيوزال[®] في حالات:

- منع أو علاج إنخفاض مستويات الكالسيوم في الدم لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم من وجباتهم الغذائية.

- نقص الكالسيوم و المعادن.

- يمكن استخدامه لعلاج الحالات الناجمة عن انخفاض مستويات الكالسيوم مثل فقدان العظام (هشاشة العظام)، ضعف العظام (لين العظام/الكساح) وانخفاض نشاط الغدة جار الدرقية (قصور الغدة جار الدرقية).

الجرعة والإستخدام:

- حبتين يومياً مع وجبة رئيسية ، تبلع مع ماء أو مشروب بارد .

- يجب أن لا تمضغ وان لا تتجاوز الجرعة المحددة.

موانع الإستعمال:

- يجب عدم اخذ الحبة في حالة الحساسية لأحد مكونات الدواء .

- عند وجود إرتقاع في نسبة أحد مكونات الدواء .

الأعراض الجانبية:

لا توجد أعراض جانبية معروفة عند إستعماله بالجرعة الموصى بها.

الإحتياطات:

- لا ينبغي أخذ أوستيوزال[®] بجرعات أعلى من المحددة من قبل الطبيب المعالج.

- أخبر طبيبك فوراً إذا حدث لك أي من هذه الآثار الجانبية النادرة الحدوث ولكنها خطيرة:

الغثيان، القيء، فقدان الشهية، فقدان الوزن الغير عادي، تغير عقلي/مزاجي، التغير في كمية البول، آلام العظام/العضلات، الصداع، زيادة العطش، زيادة التبول، ضعف، تعب.

فرط الجرعة:

- يمكن أن تشمل الأعراض من جرعة زائدة: الغثيان/القيء وفقدان الشهية، وتغيرات نفسية/مزاجية، الصداع، النعاس، الضعف والتعب.

- في حالة فرط الجرعة إستشر طبيبك او توجه لإقرب مستشفى.

التفاعلات الدوائية:

- الزنك يقلل من إمتصاص التتراسيكلين عن طريق الفم، ينبغي أن تؤخذ هذه المنتجات في غضون ساعتين عن بعضها البعض.

- الزيوت المعدنية قد تقلل من إمتصاص الفايتمينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين د.

- بعض المنتجات قد تتفاعل مع هذا الدواء وتشمل: الديجوكسين، رابطات الفوسفات، مدررات الثيازيد (مثل، هيدروكلوروثيازيد).

- الكالسيوم يمكن أن يقلل من إمتصاص الأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية

التتراسيكلينية (مثل، الدوكسيسيكلين و المينوسيكلين)، البيسفوسفونيت (مثل،

أليندرونات)، إستر اميوستين، ليفونثيروكسين، والمضادات الحيوية من مشتقات

الكنولون (مثل، سيبروفلوكساسين و الليفوفلوكساسين). يمكن لبعض الأدوية أن تقلل

من إمتصاص فيتامين د (منحبات حامض الصفراء مثل الكولستيرايمين/ كوليستيول،

الزيوت المعدنية و أورليستات). لذلك يفضل الفصل بين الجرعات.

الأبعاد: 14×21 سم
نوع الخط: Times New Roman
حجم الخط: 7
رقم البانتون: 639U
تاريخ التعديل: 2016-5-23م

	Date	Sign.
R&D		
S.O.		
Q.C.		
Q.A.		
Tec. Manager		