

سيناجيل

لعلاج الأميبا وداء الترياقوموناس

التركيب:

سيناجيل يحتوي على :
سكنديازول

يستخدم سيناجيل :

- للأميبا المعوية.
- الأميبا الكبدية.
- الجيارديا.
- الإصابة بالترياقوموناس في الجهاز البولي التناسلي عند
- اللانثانات اللاهوتية.
- التهاب المهبل غير المحدد.

يوصى

بإستعمال سيناجيل في بداية تناول الطعام .

الأميبا المعوية:

- الأميبا الحادة (من نوع الهستولوتيكيا).

للبلانغين:

مجم / كجم / يوم كجرعة واحدة.
الجرعة تؤخذ ليوم واحد فقط .

الأميبا الدقيقة

نفس الجرعة المذكورة أعلاه يوميا ولمدة ثلاث أيام .

الأميبا الكبدية:

مجم / كجم / يوم كجرعة واحدة أو مقسمة لعدة
جرعات لمدة خمسة أيام .

مجم / كجم / يوم تؤخذ كجرعة واحدة أو مقسمة
عدة جرعات لمدة خمسة أيام .

في المرحلة الخطرة من الإصابة بالأميبا الكبدية يجب
التخلص من إفرازات الدامل وتفرغها من محتواها أثناء فترة
بسيناجيل .

داء الترياقوموناس ، الجيارديا ، بكتيريا المهبل:

للبلانغين:

مجم / كجم / يوم تؤخذ كجرعة واحدة.
يمكن تكرار الجرعة مرة ثانية عند الضرورة .

الاحتياطات:

- فرط الحساسية تجاه مشتقات الإميديازول.
- الذين يشكون من اضطرابات عضوية عصبية و
دموية.

الأعراض الجانبية:

- الجهاز الهضمي: غثيان، تقيؤ، فقدان الشهية، إسهال، الشعور
شديدة: حكة واستسقاء
- تفاعلات تحسسية: نادرة الحدوث وفي حالة حدوثها تكون
شديدة: حكة واستسقاء
- تفاعلات دموية: نقص متوسط في كريات الدم البيضاء
يختفي بإيقاف المعالجة.
- اضطرابات عصبية: نادرة الحدوث: دوخة، ترنح، تنمل،
عدم إززان حركي، التهاب الأعصاب المتعددة الحسية والحركية.
- أعراض جانبية أخرى: صداع، تعب، ثقل اللسان، وميل لون

التحذيرات:

- يجب إتقاص الجرعة عند المرضى الذين لديهم أمراض
كبدية شديدة.
- يجب فحص مكونات الدم قبل وبعد المعالجة للمرضى الذين
لديهم نقص في كريات الدم البيضاء.

- يجب عدم تناول المشروبات الكحولية أثناء أخذ العلاج خشية
لت هضمية، احمرار و تقيؤ .

موانع:

- علاج فرط الجرعة يتم بالمعالجات الداعمة ومعالجة الأعراض.
- يتم إزالة الدواء عن طريق تحفيز التقيؤ،
النشط والمسهلات.

- للسيطرة على
يمكن استخدام الديازيبام والفينيتوين.

دواعي:

- يعزز سيناجيل من تأثير الوارفارين المضاد للتخثر لذلك يجب
مراقبة مستويات البروثرومبين باستمرار وبعد ثمانية أيام من إيقاف
المعالجة كما يجب ضبط الجرعة من مضادات التخثر الفموية خلال

- الاستخدام المصاحب للديسوليفرام مع سيناجيل قد يسبب الهذيان

موانع:

- ينصح بعدم استخدام سيناجيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من

موانع:

- سكنديازول (من مشتقات - نيترواميدازول) يمتاز بفعالية مضادة
للبيكتيريا اللاهوتية ووحيدات الخلية ويشبه بخواصه الميترونيدا
- يعبر السكنديازول إلى داخل الكائنات الدقيقة بواسطة الانتشار
السلبى حيث يتحول إلى الشكل النشط الناتج من اختزال مجموعة
- نيترو في المركب .
- التوافر الحيوي للسكنديازول %

جرعة فموية

جم دفعة واحدة ويصل إلى ذروة تركيزه

- يمتد سكانديازول بسرعة ولكن ليس بدرجة شاملة في الجسم بعد
تناول الجرعة الفموية منه .

- يعبر السكنديازول المشيمة ويفرز في حليب الأم .

- يحدث استقلاب السكنديازول في الكبد ولا يوجد تأثير بيولوجي

- لا يؤثر سكنديازول بالبحث أو بالتثبيط على الإنزيم الكبدى

سينوكروم P450 .

- نصف العمر لطرح السكنديازول في البلازما حوالى

- يطرح السكنديازول بشكل رئيسي في البول (%)

موانع:

سيناجيل

(شريط به
اكت يحتوي على شريط واحد) .

التحذيرات:

- يحفظ الدواء في مكان

تعليمات للمريض

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا
للتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص
عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها .

- إن الطبيب والصيدلاني هما خيرين بالدواء وينفعه

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

- احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال .

صنع بواسطة

شركة أزال لصناعة الأدوية المحدودة

السودان - الخرطوم



الأبعاد: ×
نوع الخط: Times New Roman
حجم الخط:
رقم البانتون: 3435u
تاريخ التعديل: 2015-9-8م

	Date	Sign
R&D		
Q.C		
Q.A.		
Tec. Manager		

Senagyl[®]

For Treatment of Amebiasis & Trichomoniasis

Composition:

* Each film coated tablet of **Senagyl 500** contains:
Secnidazole 500mg.

Indications:

Senagyl is indicated for the treatment of:

- Intestinal amebiasis.
- Hepatic amebiasis.
- Giardiasis.
- Urogenital trichomoniasis in both males and females.
- Anaerobic septicaemias.
- Non- specific vaginitis.

Dosage and Administration:

- **Senagyl** is recommended to be taken at the beginning of meal.

- Intestinal amebiasis:

- **Acute symptomatic amebiasis (histolytic form):**
Adults: 2 g as a single dose.

Children: 30 mg/kg/day as a single dose.

The dose is to be taken for only one day.

- A symptomatic amebiasis minute and cystic form:

The above dose daily for 3 days .

- Hepatic amebiasis:

Adults: 1.5g per day as single or divided doses for 5 days.

Children: 30 mg/kg/day as a single or divided doses for 5 days.

During the severe stage of hepatic amebiasis, any pus or abscess should be drained in conjunction with **Senagyl** treatment.

- Trichomoniasis , Giardiasis and bacterial vaginosis:

Adults: 2g as a single dose.

Children: 30-40 mg/kg/day as a single dose.

Note: Dose can be repeated another time if necessary.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the derivatives of imidazole.
- Patients who suffer from organic neurological disorders and blood dyscrasias.

Side Effects:

- Gastrointestinal tract: Nausea, vomiting, anorexia, diarrhea and sense of metallic taste.
- Hypersensitivity reactions: rare but severe when occur urticaria and edema.
- Blood reactions: moderate leukopenia , which disappears after treatment discontinuation.
- Neurological disorders: rarely occur; dizziness, ataxia, paraesthesia, incoordination , sensory and motor polyneuritis.
- Other side effects: headache , tiredness, furred tongue and darkening of the urine.

Precautions:

- Stop the use of **Senagyl** if various neurological signs develop while using the drug.
- Doses should be reduced in patients with severe liver disease.

- Blood test should be carried out before and after therapy in patients suffering from leukopenia.
- Avoid alcohol drinking during treatment with **Senagyl** because of the possibility of the risk of abdominal cramps, flushing and vomiting.

Overdose:

- Treatment of overdose is supportive and symptomatic.
- Drug is removed by induced emesis, gastric lavage, and administration of activated charcoal and use of cathartics.
- For controlling seizures, diazepam and phenytoin may be used.

Drug Interactions:

- **Senagyl** potentiates the anti- coagulant effect of warfarin , hence, prothrombin levels should be checked frequently and eight days after discontinuation . The dosage of oral anti- coagulant should be adjusted during treatment with **Senagyl** .
- Concomitant administration of disulfiram with **Senagyl** may cause delirium and confusion.

Pregnancy and Lactation:

- **Senagyl** is not recommended during the first trimester of pregnancy or during lactation.

Properties:

- Secnidazole is 5-nitroimidazole derivatives. It has activity against anaerobic bacteria and protozoa with properties similar to those of metronidazole.
- Secnidazole enters micro-organisms by passive diffusion and undergoes activation by the reduction of 5- nitro group.
- The mean absolute bioavailability of Secnidazole is 100% after oral administration of single dose of 0.5 to 2g and the maximum plasma concentration occurs within 3 hours.
- Secnidazole is rapidly, but not extensively, distributed in the body after oral administration.
- Secnidazole crosses the placenta and found in the breast milk.
- The metabolism occurs in the liver and no biological activity for the metabolite has been reported.
- Secnidazole does not appear to cause motivation or inhibition of hepatic cytochrome P450 isoenzyme.
- The plasma elimination half life of Secnidazole is about 25 hours.
- Secnidazole is mainly eliminated in urine (50% of the ingested dose is excreted within 25 hours).

Packing:

- **Senagyl 500** film-coated tablets
(Blisters of 4 tablets , pack of one blister).

Storage:

- Store in a dry and cool place, at a temperature not exceed 30° C.

THIS IS A MEDICAMENT

- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of pharmacist who sold the medication .
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consultation your doctor.
- Keep medication out of reach of children.

Produced by:

Azal Pharmaceutical Industries Co.Ltd.
Sudan - Khartoum



الأبعاد: 11×19 cm
نوع الخط: Times New Roman
حجم الخط: 6.5
رقم البانتون: 3435u
تاريخ التعديل: 2015-9-8م

	Date	Sign
R&D		
Q.C		
Q.A.		
Tec. Manager		